

Läkemedel

Granisetron Intravenös injektion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg/ml
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Granisetron ges antingen som långsam intravenös injektion eller som en utspädd intravenös infusion 5 minuter innan behandling med cytostatika påbörjas.

En ml Granisetron kan spädas ut med 5-50 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml för att ges som infusion på 5 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid cirka 9 timmar. Maxdos inom 24 timmar är 9 mg.

1-3 mg långsam iv injektion eller infusion före bemetogen behandling. Vid behandling av illamående kan ytterligare underhållsdoser administreras med minst 10 minuters mellanrum.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan		
Förstoppning vanligt. Diarré förekommer.		
Övrigt		
Huvudvärk vanligt. Sömnsvårigheter förekommer.		
Hjärttoxicitet		
EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.		