Läkemedel

Granisetron Peroral tablett

ATC-kod: A04AA02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid ca 9 timmar.

Enligt FASS: första dos ca 1 timme före emetogen behandling, 1 mg två ggr dagligen eller 2 mg 1 gång dagligen i upp till en vecka efter emetogen behandling.

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan Förstoppning vanligt. Diarré förekommer.		
Övrigt Huvudvärk vanligt. Sömnsvårigheter förekommer.		
Hjärttoxicitet EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.		

Versionsförändringar

Version 1.3
Antiemetikamarkering

Version 1.2
Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.1
tilägg övriga anvisningar läkemedel

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.