

# Antitumoralt läkemedel

## Hydroxikarbamid Per oral kapsel

Basfakta

### Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Kroppsvikt
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg/kg
<b>Administreringsväg:</b>	Per oral

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Doser över 1000 mg per dygn bör delas i två doseringstillfällen.

Tidigare benämning hydroxiurea.

### Biverkningar

<b>Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
<b>Hematologisk toxicitet</b>		
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
<b>Hudtoxicitet</b>		
Utslag, alopeci, hudsår, kutan vaskulit och hyperpigmentering vanligt. Hudcancer, varför rekommendation att skydda hud från solexponering. Tidigare strålbehandlad patient kan få exacerbation av strålningserytem.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Vanliga, men sällan allvarliga. Diarré, förstoppning, illamående, mucosit, stomatit.		
<b>Övrigt</b>		
Feber, köldrysningar, asteni, sjukdomskänsla och anorexi förekommer.		
<b>CNS påverkan</b>		
Desorientering, yrsel, huvudvärk, dåsighet och kramper förekommer.		