Antitumoralt läkemedel

Hydroxikarbamid Peroral kapsel

ATC-kod: L01XX05

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Peroral

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Doser över 1000 mg per dygn bör delas i två doseringstillfällen.

Tidigare benämning hydroxiurea.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
Hudtoxicitet Utslag, alopeci, hudsår, kutan vaskulit och hyperpigmentering vanligt. Hudcancer, varför rekommendation att skydda hud från solexponering. Tidigare strålbehandlad patient kan få exacerbation av strålningserytem.		
Gastrointestinal påverkan Vanliga, men sällan allvarliga. Diarré, förstoppning, illamående, mucosit, stomatit.		
Övrigt Feber, köldrysningar, asteni, sjukdomskänsla och anorexi förekommer.		
CNS påverkan Desorientering, yrsel, huvudvärk, dåsighet och kramper förekommer.		

Versionsförändringar

Version 1.1
Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.