Läkemedel

Hydroxokobalamin Subkutan injektion

ATC-kod: B03BA03

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Röd klar lösning.

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Immunologisk reaktion		
Reaktioner med klåda, utslag finns angivna, okänd frekvens. Anafylaxi omnämnd, sällsynt.		
Övrigt		
Reaktioner vid injektionsställe smärta, utslag och svullnad, okänd frekvens.		
Feber, frossa, rodnad, smärta finns angivna, okänd frekvens.		
Huvudvärk, känselstörning och tremor/skakning, okänd frekvens.		
Blå-grön färgad urin kan uppstå, okänd frekvens.		
Interaktionsbenägen substans		
Samtidig administrering av p-piller med hydroxokobalamin kan minska koncentration av kobalamin.		
Samtidig administrering av stora mängder av C-vitamin kan minska upptaget av kobalamin.		

Versionsförändringar

Version 1.1
Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.