

Antitumoralt läkemedel

Irinotekan Intravenös infusion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska 250 ml Glukos 50 mg/ml 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Koncentrationsintervall: 0,1-3 mg/ml
	Hållbarhet efter spädning 72 timmar
	Förvaring Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CAVE tarmobstruktion Patienter får inte behandlas med irinotekan förrän eventuell tarmobstruktion är hävd.		
Gastrointestinal påverkan Fördröjd diarré vanlig, kan bli uttalad och till och med livshotande. Loperamid ges som behandling, se FASS alternativt lokal instruktion, dock ges inte Loperamid som profylax.		Hydrering Loperamid
Kolinergt syndrom Injektion Atropin 0,25 mg ges subkutant profylaktiskt. Dosen kan upprepas.		Atropin
Interaktionsbenägen substans Metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4.		
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer