

# Antitumoralt läkemedel

## Ixazomib Per oral kapsel

## Basfakta

### Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Standarddos
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg
<b>Administreringsväg:</b>	Per oral
<b>Dosering i förh. måltid:</b>	Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Johannesört ska undvikas då det kan minska effekten av Ixazomib.

Dosen tas vid ungefär samma tidpunkt de ordinerade dagarna.

Missad dos får endast tas om det är mer än 3 dygn till nästa ordinarie dos.

### Biverkningar

<b>Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
<b>Hematologisk toxicitet</b> Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Diarré, illamående, kräkningar och förstoppning är vanligt. Om uttalade besvär, eventuell dosjustering, se FASS.		
<b>Neuropati</b> Perifer neuropati förekommer, oftast sensorisk, oftast mild. Eventuell dosjustering, se FASS.		
<b>Hudtoxicitet</b> Utslag vanligt, eventuell dosjusteringsbehov, se FASS.		
<b>Perifera ödem</b> Perifera ödem vanligt, kan bli uttalade. Utred eventuell annan bakomliggande orsak. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.		
<b>Levertoxicitet</b> Leverskador har rapporterats (hepatocellulär skada, leversteatos, kolestatisk hepatit och levertoxicitet). Följ leverenzymerna och för eventuell dosjustering, se FASS.		
<b>Graviditetsvarning</b> Kan vara fosterskadande. Ingår i regim tillsammans med Lenalidomid och Dexametason där Lenalidomid har förväntade fosterskadande effekter. Effektiv preventivmedel skall användas. Vid samtidig användning av Dexametason bör minskning av effekt hos orala preventivmedel beaktas.		
<b>Interaktionsbenägen substans</b> Effekten hos Ixazomib kan minska vid samtidig användning av starka CYP3A-inducerare, varför kombinationen bör undvikas. (Exempel på starka CYP3A-inducerare är Karbamazepin, Fenytoidin, Rifampicin och Johannesört (Hypericum perforatum)).		
<b>Infektionsrisk</b> Herpes Zoster reaktivering har rapporterats. Överväg antiviral profylax.		
<b>Övrigt</b> Ryggsmärta vanligt, oftast mild. Ögonpåverkan (dimsyn, konjunktivit, grå starr) förekommer.		