Antitumoralt läkemedel

Kladribin Intravenös infusion

ATC-kod: L01BB04

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

Spädningsinformation

Spädningsvätska
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar
Kladribin bör filtreras genom 0,2 mikrometer vid tillsats till infusionsvätskan.

Hållbarhet efter spädning
24 timmar

Förvaring
Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
Infektionsrisk	Monitorering	Infektionsbehandling/profylax
Feber har rapporterats hos hög andel patienter.		
Tumörlyssyndrom	Urat	Hydrering Allopurinol
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.		
Extravasering		
Grön		
Ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		

Versionsförändringar

Version 1.4
Extravaseringstext kortad

Version 1.3
Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.2
Extravasering grön, justerad ordning och kontroll.

Version 1.1
Lagt till filnamn under Granskning

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.