

Antitumoralt läkemedel

Kladribin Subkutan injektion

ATC-kod: L01BB04

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsvikt
Enhet för grunddos:	mg/kg
Administreringsväg:	Subkutan

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Korrekt volym dras upp i spruta och ges subkutant utan ytterligare spädnings. Om validering vid tillverkningsenheten medger lång hållbarhet kan alla injektioner i en behandling (5 dagar) förberedas.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödande behandling
Hematologisk toxicitet Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Neutropeni mycket vanligt. Lymfopeni ofta långvarig. Trombocytopeni och anemi vanligt. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Infektionsrisk Infektioner vanliga.	Monitorering	Infektionsbehandling/profylax
Tumörlyssyndrom	Urat	Hydrering Allopurinol
Hyperurikemi sällsynt, men finns rapporterat. Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lyses av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.		
Gastrointestinal påverkan Illamående, kräkningar, förstoppning, diarré och aptitnedgång vanliga.		
Hudtoxicitet Utslag, lokalt exantem, vanligt. Klåda, hudsmärtor och erytem förekommer. Stevens-Johnsons syndrom/Lyells syndrom sällsynt.		
CNS påverkan Huvudvärk och yrsel vanligt. Sömnsvårigheter, ångest förekommer. Parestesi, polyneuropati, ataxi och förvirring finns rapporterat. Enstaka fall av apoplexi, tal och sväljstörningar och epileptiska anfall. PML (Progressiv multifokal leukoencefalopati) enstaka fall finns rapporterade, biverkansstart kan ske lång tid efter behandlingen. Överväg diagnos vid nya eller förvärrade neurologiska, kognitiva eller beteendemässiga tecken eller symtom.		
Andningsvägar Onormala andningsljud, bröstljud och hosta vanligt. Andfåddhet, infiltrat och mukosit förekommer.		
Övrigt Reaktioner vid injektionsställe vanligt. Feber, trötthet, asteni vanligt. Muskelsmärta, led- och skelettsmärta förekommer. Ödem och sjukdomskänsla förekommer.		
Levertoxicitet Reversibel ökning av bilirubin och transaminaser förekommer, oftast lindriga. Leversvikt sällsynt.		
Övrigt Sekundära maligniteter förekommer, störst risk 2 år efter diagnos.		
Graviditetsvarning Teratogena och mutagena egenskaper. Kvinnor i fertil ålder måste använda effektiv preventivmetod under behandlingen och i sex månader efter sista dos.		

Versionsförändringar

Version 1.0

Används inte i någon regim. (arkiverad)

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.