

# Läkemedel

## Klemastin Peroral tablett

ATC-kod: R06AA04

## Basfakta

### Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Standarddos  
**Enhet för grunddos:** mg  
**Administreringsväg:** Peroral

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

För förbättrad absorption bör TAVEGYL intagas före måltid.

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tablett innehåller laktos.

#### Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

### Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
-------------	----------	----------------------

#### CNS påverkan

Trötthet, dåsighet förekommer. Yrsel, huvudvärk finns rapporterat. Paradoxal excitation finns omnämnt som sällsynt, eventuellt större risk hos barn och äldre personer.

#### Gastrointestinal påverkan

Muntorrhet ovanligt, men kan förekomma vid långtidsbehandling.

Förstoppning omnämns som mycket ovanligt.

#### Interaktionsbenägen substans

Antihistaminer förstärker sederande effekt hos andra substanser med hämmande effekt på CNS. (Exempel på andra substanser med hämmande effekt på CNS är: sömnmedel, antidepressiva, anxiolytikum, opioider och alkohol.)

Klemastin har en viss antikolinerg aktivitet varför effekten hos andra substanser med antikolinerg effekt kan potentieras. (Exempel på andra substanser med antikolinerg effekt är: atropin, tricykliska antidepressiva medel.)