

## Läkemedel

# Klemastin Peroral tablett

ATC-kod: R06AA04

Basfakta

## Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral

## Anvisningar

### Anvisningar för läkemedelsadministration

För förbättrad absorption bör TAVEGYL intagas före måltid.

### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tablett innehåller laktos.

### Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>CNS påverkan</b>		
Trötthet, dåsigheit förekommer. Yrsel, huvudvärk finns rapporterat. Paradoxal excitation finns omnämnt som sällsynt, eventuellt större risk hos barn och äldre personer.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Muntorrhet ovanligt, men kan förekomma vid långtidsbehandling.		
Förstoppning omnämns som mycket ovanligt.		
<b>Interaktionsbenägen substans</b>		
Antihistaminer förstärker sederande effekt hos andra substanser med hämmande effekt på CNS. (Exempel på andra substanser med hämmande effekt på CNS är: sömmedel, antidepressiva, anxiolytikum, opioider och alkohol.)		
Klemastin har en viss antikolinerg aktivitet varför effekten hos andra substanser med antikolinerg effekt kan potentieras. (Exempel på andra substanser med antikolinerg effekt är: atropin, tricykliska antidepressiva medel.)		

## Versionsförändringar

### Version 1.5

granskad för barn kryss

### Version 1.4

Lagt till handhavandeinfo.

### Version 1.3

justerad text interaktioner

### Version 1.2

används för barn kryss

### Version 1.1

Uppdaterad inför barnkryss

**Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.