

Läkemedel

Klemastin Peroral tabletter

ATC-kod: R06AA04

Basfakta

Doseringsspekter

Beräkningssätt: Standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

För förbättrad absorption bör TAVEGYL intagas före måltid.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tablett innehåller laktos.

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CNS påverkan		
Trötthet, dåsighet förekommer. Yrsel, huvudvärk finns rapporterat. Paradoxal excitation finns omnämnt som sällsynt, eventuellt större risk hos barn och äldre personer.		
Gastrointestinal påverkan		
Muntorrhett ovanligt, men kan förekomma vid långtidsbehandling.		
Förstoppning omnämns som mycket ovanligt.		
Interaktionsbenägen substans		
Antihistaminer förstärker sederande effekt hos andra substanser med hämmande effekt på CNS. (Exempel på andra substanser med hämmande effekt på CNS är: sömnmedel, antidepressiva, anxiolytikum, opioider och alkohol.)		
Klemastin har en viss antikolinerg aktivitet varför effekten hos andra substanser med antikolinerg effekt kan potentieras. (Exempel på andra substanser med antikolinerg effekt är: atropin, tricykliska antidepressiva medel.)		