Antitumoralt läkemedel

Licenspreparat

Krisantaspas Intramuskulär injektion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsyta
Enhet för grunddos: IE/m^2
Administreringsväg: Intramuskulär

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Krisantaspas = Erwinia L-asparaginas (Erwinase)

Spädningsinformation

Spädningsvätska
1 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar
Krisantaspas 10 000 IE löses med 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml, vilket ger koncentrationen 10 000 IE/ml.

Rotera försiktigt tills all substans är löst i upprätt läge. Lösningen ska vara klar utan synliga partiklar.

Ordinerad dos dras omedelbart upp i spruta och förses med skyddshatt.

Hållbarhet efter spädning	Förvaring
8 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)	Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi Hypersensitivitetsreaktion vanligt.		Akutberedskap
Endokrinologi Hyperglykemi vanligt, kan bli uttalad.		
Gastrointestinal påverkan Illamående, kräkning vanligt. Pankreatit vanligt.		
Tromboembolism Tromboser inkluderande lungemboli och cerebrovaskulära händelser förekommer. Troligen på grund av reduktion av fibrinogen och andra koagulationsfaktorer.		

Versionsförändringar

Version 1.0
Denna basfakta ingår inte i någon regim, därför arkiveras den. (arkiverad)