

Antitumoralt läkemedel

Krisantaspas Intramuskulär injektion

ATC-kod: L01XX02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intramuskulär

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Krisantaspas finns som två registrerade läkemedel Enrylaze och Erwinase. Dessa doseras efter olika principer och är inte utbytbara i en behandlingscykel.

Denna basfakta baseras på <https://fass.se/health/product/20220525000017/smpcsom> doseras i mg.

För intramuskulär injektion:

För patienter med kroppsyta > 0,5 m² ges högst 2 ml injektionsvätska per injektionsställe.

För patienter med kroppsyta < 0,5 m² ges högst 1 ml injektionsvätska per injektionsställe.

Om ordinerad dos motsvarar större volym ska denna delas upp på flera injektionsställen.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:

Information om särskild skyddsutrustning vid hantering saknas och det finns inte upptaget i några listor över "Hazardous drugs". Ta hänsyn till att läkemedlet kan vara sensibiliserande.

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Beräknad dos dras upp i spruta utan ytterligare spädnings. Obs, kan fördelas på flera sprutor vb.

Hållbarhet efter spädnings
8 timmar
24 timmar

Förvaring
Rumstemperatur
Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi	Blodtryck Puls	Akutberedskap
Hypersensitivitetsreaktion vanligt, oftast grad 1-2, anafylaxi ovanligt.		
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Koagulationsrubbningar förekommer, kan bli allvarliga. Både trombos och blödningsbenägenhet. Ökad risk för koagulationsrubbning kan finnas vid samtidig kortisonbehandling, se FASS, interaktioner.		
Anemi, trombocytopeni och myelosuppression omnämns, men osäkerhet om kombinationssubstans som orsak.		
CNS påverkan	Biverkningskontroll	
Cerebral trombos (inklusive hjärninfarkt och sinustrombos) har rapporterats pga koagulationsrubbning.		
Encefalopati, förvirring, hallucinationer förekommer. Krampanfall och yrsel har rapporterats. Fallrapport om reversibelt posterioert leukoencefalopati (PRES).		
Levertoxicitet	Leverfunktion	
Förhöjda levervärden mycket vanligt, rapporter om allvarlig leverpåverkan finns. Kontroll av levervärden före och under behandling.		

Fortsättning på nästa sida

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan Akut pankreatit vanligt, kan bli allvarlig, enstaka dödsfall rapporterade. Omnämns även enstaka rapporter om sen debut, dvs efter behandlingens avslut. Illamående, kräkning och viktnedgång vanligt och diarré, buksmärta förekommer enligt tabell, men osäkerhet om kombinationssubstans som orsak.	Biverkningskontroll	
Endokrinologi Hyperglykemi vanligt, behandlingsbehov med insulin förekommer. Hypertriglyceridemi, och pseudohyponatremi till följd av detta, förekommer. Risk förhöjda ammoniumjon-nivåer, delvis förväntad behandlingseffekt. Kontroll ammoniumjon rekommenderas, i synnerhet vid kraftigt illamående/biverkningar, kan kräva åtgärd.	Biverkningskontroll Elektrolyter	
Immunologisk reaktion Urtikaria förekommer, hudutslag, klåda, eksematösa utslag förekommer. Vid allergisk reaktion finns stor risk att antikropps bildning skett. Enzymaktivitet kontrolleras vanligen regelbundet under behandlingen, extra prov bör vanligen tas enligt särskild instruktion vid misstanke om allergisk reaktion för att undersöka eventuell inaktivering.	Biverkningskontroll	
Interaktionsbenägen substans Erwinia Asparaginas har substansnamnet Krisantaspas. Administrering av Krisantaspas i kombination med eller omedelbart före prednison kan ge ökad toxicitet (kan öka risken för koagulationsrubbnig). Administrering av Krisantaspas samtidigt med eller omedelbart före Vinkristin kan förknippas med ökad toxicitet och ökad risk för anafylaxi. Samtidig administrering av Krisantaspas och läkemedel som påverkar leverfunktion kan ge ökad risk för levertoxicitet. Samtidig administrering av Imatinib med Krisantaspas kan ge ökad risk för levertoxicitet, se FASS. Interaktion med Metotrexat och Cytarabin kan förekomma, se FASS.		

Versionsförändringar

Version 1.0

Basfakta fastställdes.