

Antitumoralt läkemedel

Lanreotid Subkutan injektion

ATC-kod: H01CB03

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Subkutan

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges i övre yttre kvadranten av skinkan (djup subkutan injektion) eller i det övre yttre låret. Till patienter som får en konstant dos av Somatuline Autogel kan produkten ges, efter lämplig träning, antingen av patienten själv eller av en tränad person.

Vid självinjektion ska injektionen ges i det övre yttre låret.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Läkemedlet förvaras kallt. Läkemedlet kan förvaras i rumstemperatur inför användning, dock högst 24 timmar.

Använd inte produkten om den laminerade skyddspåsen är skadad eller tidigare öppnad.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan		
Diarré, lös avföring och buksmärta vanligt. Illamående, kräkningar och förstoppning förekommer. Gasbildning förekommer. Steatorré (oljig avföring) och missfärgad avföring finns rapporterat.		
Levertoxicitet		
Gallstensbesvär vanligt. Kolecystit finns rapporterat. Lanreotid kan reducera gallblåsans motilitet vilket kan leda till gallstensbildning.		
Förhöjda levervärden förekommer.		
Övrigt		
Reaktion vid injektionsstället (smärta, svullnad, förhårdnad, knöl och klåda) förekommer. Böld vid injektionsstället finns rapporterat.		
Endokrinologi	Blodvärden	
Hypoglykemi och hyperglykemi förekommer. Följ blodsockernivå vid behandlingsstart och vid dosändringar. Diskret sänkning av sköldkörtelfunktion finns rapporterat.		
Hjärttoxicitet		
Bradykardi förekommer. Försiktighet om patienten sedan tidigare har låg hjärtfrekvens.		
Övrigt		
Muskuloskeletal smärta, myalgi förekommer.		
Trötthet, asteni förekommer. Yrsel, huvudvärk förekommer.		

Fortsättning på nästa sida

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
--------------------	-----------------	-----------------------------

Interaktionsbenägen substans

Farmakologisk effekt på gastrointestinalkanal kan ge reducerat upptag av andra läkemedel. Exempel som omnämns är cyklosporin, se FASS.

Samtidig administrering av hjärtfrekvenssänkande läkemedel med Lanreotid bör ske med försiktighet, då Lanreotid kan ge sänkning av hjärtfrekvens i sig självt.

Samtidig administrering av substanser som metaboliseras via CYP3A4 med lågt terapeutiskt index (som quinidin och terfenadin) med Lanreotid ska ske med försiktighet, då Lanreotid kan ha minskande effekt på metabolisk clearance av substanser som metaboliseras via CYP3A4.

Versionsförändringar

Version 1.1

Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.