Antitumoralt läkemedel

Letrozol Peroral tablett

ATC-kod: L02BG04

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förh. måltid: Tas med eller utan måltid

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Samtidig administrering av Letrozol och Tamoxifen, andra antiöstrogener eller östrogener bör undvikas, då Letrozols farmakologiska verkan kan minska.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt Potent östrogensänkande preparat, varför ökad risk för bentäthetssänkning. Frakturer och osteporos finns rapporterat. Bentäthetsmätning före behandlingsstart hos patienter med ökad risk sedan tidigare, överväg eventuell behandling mot osteoporos eller profylax.		
Övrigt Led och muskelsmärta vanligt.		
CNS påverkan Huvudvärk, yrsel och trötthet vanligt. Sömnstörningar, smakförändring och minnesförsämring finns rapporterat. Cerebrovaskulära händelser har inträffat.		
Hjärttoxicitet Hjärtklappning och ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp, hjärtinfarkt) finns rapporterat.		
Hudtoxicitet Ökad svettning vanligt. Håravfall /alopeci förekommer. Utslag, torrhet förekommer.		
Gastrointestinal påverkan Illamående, sura uppstötningar, förstoppning, buksmärta, diarré och kräkning förekommer.		
Övrigt Hyperkolesterolemi vanligt. Eventuellt behov av kolesterolsänkande medicinering.		
Graviditetsvarning Hos premenopausala kvinnor leder hämning av östrogensyntes till follikeltillväxt och kan därmed inducera ovalution. Letrozol bör endast ges till postmenopausala kvinnor, men det finns rapporter om återkomst av ovariell funktion även hos postmenopausala kvinnor under behandling med Letrozol. Letrozol kan orsaka kongenitala missbildningar.		

Versionsförändringar

Version 1.1
arkivering, ny basfakta skriven

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.