

# Läkemedel

## Leuprorelin Subkutan injektion

## BASFakta

### Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Standarddos
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg
<b>Administreringsväg:</b>	Subkutan

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Ett implantat injiceras subkutan i främre bukväggen. Se läkemedlets bruksanvisning för exakt hantering av applikatorn. Före injektion kan ett lokalanestetikum ges.

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Övrigt</b> Värmevallning mycket vanligt. Svettning mycket vanligt. Humörförändringar och depression vanligt. Sömnbesvär vanligt. Huvudvärk och yrsel förekommer. Trötthet förekommer. Minskad libido och impotens vanligt. Testikelatrofi förekommer. Gynekomasti förekommer..		
<b>Övrigt</b> Artralgi (ledsmärta) förekommer. Smärta ben, skuldra eller nedre rygg förekommer. Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos.		
<b>Hudtoxicitet</b> Utslag och klåda förekommer. Reaktion vid injektionsstället förekommer.		
<b>CNS påverkan</b> Parestesi förekommer. Fallrapporter om kramphändelser.		
<b>Övrigt</b> Metabola förändringar som minskad glukostolerans, viktförändringar, förhöjda kolesterolnivåer kan ge ökad risk för kardiovaskulära händelser som angina, hjärtinfarkt, stroke. Minskad muskelmassa och minskad prestationsförmåga finns rapporterat.		
<b>Hjärttoxicitet</b> Fallrapport om förlängd QT-tid och arytmirisk. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.		