

## Läkemedel

# Leuprorelin Subkutan injektion

ATC-kod: L02AE02

## Basfakta

### Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Subkutan

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Ett implantat injiceras subkutant i främre bukväggen. Se läkemedlets bruksanvisning för exakt hantering av applikatorn.

Före injektion kan ett lokalanestetikum ges.

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

##### Handhavande

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Övrigt</b> Värmevallning mycket vanligt. Svettning mycket vanligt. Humörförändringar och depression vanligt. Sömnbesvär vanligt. Huvudvärk och yrsel förekommer. Trötthet förekommer. Minskad libido och impotens vanligt. Testikelatrofi förekommer. Gynekomasti förekommer..		
<b>Övrigt</b> Artralgi (ledsmärta) förekommer. Smärta ben, skuldra eller nedre rygg förekommer. Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos.		
<b>Hudtoxicitet</b> Utslag och klåda förekommer. Reaktion vid injektionsstället förekommer.		
<b>CNS påverkan</b> Parestesi förekommer. Fallrapporter om kramphändelser.		
<b>Övrigt</b> Metabola förändringar som minskad glukostolerans, viktförändringar, förhöjda kolesterolnivåer kan ge ökad risk för kardiovaskulära händelser som angina, hjärtinfarkt, stroke. Minskad muskelmassa och minskad prestationsförmåga finns rapporterat.		
<b>Hjärttoxicitet</b> Fallrapport om förlängd QT-tid och arytmirisk. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.		

### Versionsförändringar

#### Version 1.1

Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.