Läkemedel

Leuprorelin Subkutan injektion

ATC-kod: L02AE02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ett implantat injiceras subkutant i främre bukväggen. Se läkemedlets bruksanvisning för exakt hantering av applikatorn.

Före injektion kan ett lokalanestetikum ges.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk.

Skyddsnivå baseras på riskanalys speciellt med hänsyn till gravida medarbetare och hur ofta läkemedlet hanteras på enheten.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt	Biverkningskontroll	
Värmevallning mycket vanligt. Svettning mycket vanligt.		
Humörförändringar och depression vanligt. Sömnbesvär vanligt.		
Huvudvärk och yrsel förekommer.		
Trötthet förekommer.		
Minskad libido och impotens mycket vanligt. Testikelatrofi förekommer. Gynekomasti förekommer.		
Övrigt	Biverkningskontroll	
Ökad risk minskad bentäthet vid långtidsbehandling antiandrogener, mer framträdande än tidigare listor per substans enligt klinisk erfarenhet. Risk för fraktur. Se över övriga riskfaktorer, kronisk alkohol och tobaksanvändning, ärftlighet, långtidsbehandling med antiepileptisk medicinering och/eller kortikosteroider. Gör bentäthetsmätning, se över kalk, D-vitamin och sköldkörtelvärden och överväg direkt benstärkande behandling vid behov.		
Artralgi (ledsmärta) förekommer. Smärta ben, skuldra eller nedre rygg förekommer.		
Hudtoxicitet		
Utslag och klåda förekommer.		
Reaktion vid injektionsstället förekommer.		
CNS påverkan		
Parestesi förekommer.		
Fallrapporter om kramphändelser.		
Övrigt	Vikt	
Metabola förändringar som minskad glukostolerans, viktuppgång, förhöjda kolesterolnivåer kan ge ökad risk för kardiovaskulära händelser som angina, hjärtinfarkt, stroke. Minskad muskelmassa och minskad prestationsförmåga finns rapporterat.		
Hjärttoxicitet		
Fallrapport om förlängd QT-tid och arytmirisk. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.		

Versionsförändringar

Version 1.3
Bentäthet, viktökning och ökad vanlighet libido.

Version 1.2
Justerat handhavandeinformation. Hänvisar till egen riskanalys.

Version 1.1
Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.