

Läkemedel

Mesna Intravenös injektion

ATC-kod: V03AF01

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Mesna kan administreras som intravenös injektion eller infusion. Det kan också ges peroralt.

Mesna skall inte ges i samma dropp som cisplatin/carboplatin eftersom blandningen gulfärgas. Preparaten kan däremot ges i samma kur förutsatt att de ges i separata ingångar eller vid skilda tidpunkter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Behandling med mesna skall pågå lika länge som behandling med oxazafosforiner plus den tid det tar för metaboliterna att nå icke-

toxiska nivåer. (Ifosfamid och Cyklofosfamid).

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Mesna kan också levereras blandad i samma dropp som ifosfamid. Hållbarheten är då längre.

Hållbarhet efter spädning
12 timmar

Förvaring
Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

Akut infusionsreaktion/anafylaxi

Fallrapporter om allvarliga allergiska reaktioner.

Akutberedskap

Hudtoxicitet

Hudutslag, klåda vanligt. Allvarliga hudreaktioner finns rapporterade.

Gastrointestinal påverkan

Buksmärta, illamående, diarré vanligt. Kräkningar, förstoppning förekommer.

Övrigt

Huvudvärk, trötthet, svimningskänsla vanligt.

Värmevallning vanligt.

Muskel- och ledvärk förekommer.