

Läkemedel

Mesna Peroral tablett

ATC-kod: V03AF01

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Peroral

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kan också ges som injektion eller infusion.

Vid beräkning av antal tablettor som ska ges, avrundas nedåt till närmsta hel tablett.

Jämfört med intravenös administrering är den totala mängden mesna som utsöndras i urinen efter oral administrering approximativt 50%. Utsöndringen i urinen sker med upp till 2 timmars fördröjning och är mer utdragen än efter intravenös administrering.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Behandling med mesna skall pågå lika länge som behandling med oxazafosforiner plus den tid det tar för metaboliterna att nå icke-

toxiska nivåer. (Ifosfamid och Cyklofosfamid).

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi Fallrapporter om allvarliga allergiska reaktioner.		Akutberedskap
Hudtoxicitet Hudutslag, klåda vanligt. Allvarliga hudreaktioner finns rapporterade.		
Gastrointestinal påverkan Buksmärta, illamående, diarré vanligt. Kräkningar, förstoppning förekommer.		
Övrigt Huvudvärk, trötthet, svimningskänsla vanligt. Värmevallning vanligt. Muskel- och ledvärk förekommer.		

Versionsförändringar

Version 1.4

Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.3

granskad barn

Version 1.2

används för barn

Version 1.1

Uppdaterad tillagda biverkningstexter

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.