

## Läkemedel

# Metoklopramid Intravenös injektion

ATC-kod: A03FA01

Basfakta

## Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsvikt
Enhet för grunddos:	mg/kg
Administreringsväg:	Intravenös

## Anvisningar

### Anvisningar för läkemedelsadministration

Långsam injektion under minst 3 minuter.

Kan också ges som infusion under minst 15 minuter.

### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid angiven som 4-6 timmar, ökar vid nedsatt njurfunktion till 10-15 timmar och vid levercirros finns ackumuleringsrisk. Rekommenderad engångsdos 10 mg, max 30mg/dygn eller 0,5 mg/kg.

Tidsintervallet 6 timmar mellan doser skall respekteras för att undvika överdosering, se FASS. Gäller även om misstanke att dosen ej erhållits vid kräkning eller diarré.

### Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b>		
Methemoglobinemi (leder till cyanos) har rapporterats.		
<b>CNS påverkan</b>		
Somnolens, trötthet, vanligt, dosrelaterad.		
Extrapyramidala reaktioner förekommer (akut dystoni, dyskinesi, parkinsonistiska symtom och akatysi) främst vid höga doser, men kan uppkomma redan vid enstaka dosering. Högre risk hos barn/unga. Försiktighet vid kända neurologiska sjukdomar, kontraindicerad vid Parkinsons sjukdom och epilepsi, då risk för ökade symtom.		
Reversibla, men kan kräva symtomatisk behandling, enl FASS: bensodiazepiner till barn och/eller antikolinerga läkemedel mot Parkinsons sjukdom till vuxna.		
Malignt neuroleptika syndrom har rapporterats.		
Tardiv dyskinesi har rapporterats, särskilt hos äldre risk bli irreversibel, därav ska kontinuerlig behandling ej överstiga 3 månader, se FASS.		
<b>Hjärttoxicitet</b>		
Bradykardi har rapporterats, högre risk vid intravenös behandling.		
<b>Hypertoni</b>		
Rapporter om hypertension finns, kan utlösa hypertensiv kris hos patient med feokromocytom.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Diarré förekommer, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling.		
<b>Övrigt</b>		
Nedstämdhet förekommer, hallucinationer rapporterade, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling.		

## Versionsförändringar

### Version 1.3

Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.2**

uppdatering av observandum

**Version 1.1**

tillägg övriga anvisn läkemedel

**Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.