Läkemedel

# Metoklopramid Intravenös injektion

ATC-kod: A03FA01

Basfakta

## Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Kroppsvikt
**Enhet för grunddos:** mg/kg
**Administreringsväg:** Intravenös

## Anvisningar

**Anvisningar för läkemedelsadministration**

Långsam injektion under minst 3 minuter.

Kan också ges som infusion under minst 15 minuter.

**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**

Halveringstid angiven som 4-6 timmar, ökar vid nedsatt njurfunktion till 10-15 timmar och vid levercirros finns ackumuleringsrisk. Rekommenderad engångsdos 10 mg, max 30mg/dygn eller 0,5 mg/kg.

Tidsintervallet 6 timmar mellan doser skall respekteras för att undvika överdosering, se FASS. Gäller även om misstanke att dosen ej erhållits vid kräkning eller diarré.

**Handhavande**:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---|---|
| **Hematologisk toxicitet**<br>Methemoglobinemi (leder till cyanos) har rapporterats. | | |
| **CNS påverkan**<br>Somnolens, trötthet, vanligt, dosrelaterad.<br>Extrapyramidala reaktioner förekommer (akut dystoni, dyskinesi, parkinsonistiska symtom och akatisi) främst vid höga doser, men kan uppkomma redan vid enstaka dosering. Högre risk hos barn/unga. Försiktighet vid kända neurologiska sjukdomar, kontraindicerad vid Parkinsons sjukdom och epilepsi, då risk för ökade symtom.<br>Reversibla, men kan kräva symtomatisk behandling, enl FASS: bensodiazepiner till barn och/eller antikolinerga läkemedel mot Parkinsons sjukdom till vuxna.<br>Malignt neuroleptika syndrom har rapporterats.<br>Tardiv dyskenesi har rapporerats, särskilt hos äldre risk bli irreversibel, därav ska kontinuerlig behandling ej överstiga 3 månader, se FASS. | | |
| **Hjärttoxicitet**<br>Bradykardi har rapporterats, högre risk vid intravenös behandling. | | |
| **Hypertoni**<br>Rapporter om hypertension finns, kan utlösa hypertensiv kris hos patient med feokromocytom. | | |
| **Gastrointestinal påverkan**<br>Diarré förekommer, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling. | | |
| **Övrigt**<br>Nedstämdhet förekommer, hallucinationer rapporterade, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling. | | |
| **Extravasering**<br>**Grön**<br>Ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering). | | |

## Versionsförändringar

**Version 1.4**
Extravaseringskodning grön.

**Version 1.3**
Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.2**
uppadtering av observandum

**Version 1.1**
tillägg övriga anvisn läkemedel

**Version 1.0**
Basfaktan fastställdes.