

Läkemedel

Metoklopramid Per oral tablett

Basfakta

Doseringsaspekter

| | |
|----------------------------|-------------|
| Beräkningssätt: | Standarddos |
| Enhet för grunddos: | mg |
| Administreringsväg: | Per oral |

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid angiven som 5-6 timmar, ökar vid nedsatt njurfunktion till 10-15 timmar och vid levercirros finns ackumuleringsrisk. Rekommenderad engångsdos 10 mg, max 30mg/dygn eller 0,5 mg/kg och maximal behandlingstid 5 dagar.

Tidsintervallet 6 timmar mellan doser skall respekteras för att undvika överdosering, se FASS. Gäller även om misstanke att dosen ej erhållits vid kräkning eller diarré.

Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Hematologisk toxicitet | | |
| Methemoglobinemi (leder till cyanos) har rapporterats. | | |
| CNS påverkan | | |
| Somnolens, trötthet, vanligt, dosrelaterad. | | |
| Extrapyramidala reaktioner förekommer (akut dystoni, dyskinesi, parkinsonistiska symtom och akatysi) främst vid höga doser, men kan uppkomma redan vid enstaka dosering. Högre risk hos barn/unga. Försiktighet vid kända neurologiska sjukdomar, kontraindicerad vid Parkinsons sjukdom och epilepsi, då risk för ökade symtom. | | |
| Reversibla, men kan kräva symtomatisk behandling, enl FASS: bensodiazepiner till barn och/eller antikolinerga läkemedel mot Parkinsons sjukdom till vuxna. | | |
| Malignt neuroleptika syndrom har rapporterats. | | |
| Tardiv dyskinesi har rapporterats, särskilt hos äldre risk bli irreversibel, därav ska kontinuerlig behandling ej överstiga 3 månader, se FASS. | | |
| Hjärttoxicitet | | |
| Bradykardi har rapporterats, högre risk vid intravenös behandling. | | |
| Hypertoni | | |
| Rapporter om hypertension finns, kan utlösa hypertensiv kris hos patient med feokromocytom. | | |
| Gastrointestinal påverkan | | |
| Diarré förekommer, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling. | | |
| Övrigt | | |
| Nedstämdhet förekommer, hallucinationer rapporterade, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling. | | |