Antitumoralt läkemedel

Mifamurtid Intravenös infusion

ATC-kod: L03AX15

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m^2
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar
Låt injektionsflaskan med det frystorkade pulvret anta rumstemperatur, tar ca 30 minuter.

Bifogat filter sätts på injektionsflaskan. 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml dras ur infusionspåsen på 100 ml och sätts långsamt till injektionsflaskan via filtret. **Filtret och sprutan får inte avlägsnas från injektionsflaskan!**

Låt injektionsflaskan stå orörd i 1 minut, skaka därefter kraftigt under 1 minut (liposomerna bildas). Styrkan är 0,08 mg/ml.

Ordinerad dos dras från injektionsflaskan via filtret. Därefter skiljs sprutan från filtret och innehållet sätts till infusionspåsen som vänds försiktigt.

Hållbarhet efter spädning
6 timmar

Förvaring
Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
Övrigt Huvudvärk, yrsel, feber, trötthet och sjukdomskänsla vanligt. Även muskelvärk och ledvärk vanligt.		
Gastrointestinal påverkan Illamående, kräkningar, aptitnedgång, diarré, förstoppning och anorexi vanligt.		
Andningsvägar Andningsbesvär inklusive hosta, andfåddhet och andnöd vanligt. Profylax med bronkdilaterare bör övervägas till patienter med anamnes på obstruktiv sjukdom (astma och KOL).		
Hudtoxicitet Hyperhidros (svettning), utslag, klåda.		
Hjärttoxicitet Takykardi. Hyper- och hypotoni.		
Extravasering **Grön** Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		

Versionsförändringar

Version 1.0
extravaseringsinfo inlagd trots arkiverad (arkiverad)

Version 1.0
Tillhandahålls ej och ingår inte i någon regim. (arkiverad)