

## Antitumoralt läkemedel

# Mitoxantron Intraperikardiell instillation

ATC-kod: L01DB07

**BASFakta**

## Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intraperikardiell

## Anvisningar

### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

#### Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)  
<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b> Enligt studie har endast enstaka patient fått mild leukopeni.		
<b>Hjärttoxicitet</b> Enligt studie var exklusionskriterier: verifierad kardiomyopati, icke behandlad hjärtsvikt och uttalad arytm. Således saknas kunskap om eventuella biverkningar hos sådana patienter.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Enligt studie enstaka patient upplevt aptitnedgång under några veckor efter instillation.		
<b>Starkt vävnadsretande</b>		

## Versionsförändringar

### Version 1.1

Lagt till handhavandeinfo.

### Version 1.0

Basfaktan fastställdes.