Antitumoralt läkemedel

Mitoxantron Intraperikardiell instillation

ATC-kod: L01DB07

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intraperikardiell

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Enligt studie har endast enstaka patient fått mild leukopeni.		
Hjärttoxicitet Enligt studie var exklusionskriterier: verifierad kardiomyopati, icke behandlad hjärtsvikt och uttalad arytmi. Således saknas kunskap om eventuella biverkningar hos sådana patienter.		
Gastrointestinal påverkan Enligt studie enstaka patient upplevt aptitnedgång under några veckor efter instillation.		
Starkt vävnadsretande		

Versionsförändringar

Version 1.1
Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.