Antitumoralt läkemedel

Mogamulizumab Intravenös infusion

ATC-kod: L01FX09

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Använd ett infusionsset med inbyggt eller monterat filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,22 mikrometer).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande:

Okonjugerad monoklonal antikropp, läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner ihttps://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

Spädningsinformation

Spädningsvätska
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar
Kemiskt stabilt 24 timmar i rumstemperatur och normalt ljus. Tillverkaren rekommenderar kylförvaring av mikrobiologiska skäl.

Koncentrationsintervall: 0,1-3 mg/ml

Hållbarhet efter spädning	Förvaring
24 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)	Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi	Monitorering Blodtryck Puls	Akutberedskap
Infusionsreaktioner vanliga, oftast grad 1-2, men grad $\geq$ 3 förekommer. Reaktionen kommer oftast under eller kort efter första infusionen. Avbryt infusion, minskad infusionshastighet vid återstart, om grad 4 permanent utsättning av behandlingen, se FASS.		
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet, dock förekommer anemi, neutropeni, lymfocytopeni och trombocytopeni.		
Infektionsrisk		Infektionsbehandling/profylax
Ökad infektionsrisk.		
Hudtoxicitet	Biverkningskontroll	
Utslag vanligt, oftast grad 1-2, dock förekommer grad $\geq$3. Både tidig och sen debut. Eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling, se FASS. Allvarliga hudbiverkningar så som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats, varför noggrann monitorering av hudbiverkan behövs.		
Gastrointestinal påverkan		
Diarré, illamående, förstoppning och mucosit vanligt. Kräkningar förekommer.		
Levertoxicitet	Leverfunktion	
Förhöjda levervärden vanligt. Hepatit ovanligt.		

Fortsättning på nästa sida

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt	Tyroidea	
Trötthet, perifera ödem och feber vanligt. Huvudvärk vanligt. Hypothyreos förekommer.		
Graviditetsvarning Fertila kvinnor ska använda effektivt preventivmedel under behandlingen och minst 6 månader efter avslutad behandling.		
Extravasering **Grön** Ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		

Versionsförändringar

Version 1.4
kontroller tillagda

Version 1.3
Extravaseringsklass grön.

Version 1.2
Justerat enhet / beräkningssätt

Version 1.1
Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.