

Antitumoralt läkemedel

Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), stam Tice, levande försvagad Intravesikal instillation

ATC-kod: L03AX03

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravesikal

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Urinkateter sätts och blåsan töms helt. Instillera lösningen från 50 ml sprutan i urinblåsan. Katetern avlägsnas. Lösningen ska kvarhållas i blåsan under 2 timmar. Viktigt att lösningen har kontakt med slemhinneytan under tiden. Patienten ska därför mobiliseras så mycket som möjligt. Efter 2 timmar ska patienten tömma ut den instillerade lösningen, helst i sittande ställning.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Patienten ska inte dricka under en period av 4 timmar före och 2 timmar efter instillationen. Om inte medicinska hinder föreligger rekommenderas att patienten tillförs stora mängder vätska under 2 dygn efter instillationen.

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Till en injektionsflaska med pulver (12,5 mg) tillsätts 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Blanda väl. Dra upp lösningen i en 50 ml spruta. Injektionsflaskan sköljs ur med ytterligare 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml och innehållet dras också upp i 50 ml sprutan. Tillsätt Natriumklorid 9 mg/ml till totalvolym 50 ml i sprutan. Den färdigberedda lösningen används omedelbart.

Se FASS för spädnings och administrering.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Cystit Obehag och smärta vid miktion vanlig och övergående.		
Immunologisk reaktion Övergående systemisk BCG-reaktion: låg feber, influensaliknande symtom och allmänt obehag. Avklingar vanligen inom 24-48 timmar.		Paracetamol
Infektionsrisk Allvarlig systemisk BCG-reaktion/infektion: feber >39 grader i minst 12 timmar, feber > 38,5 grader i minst 48 timmar, se FASS. Kan leda till BCG-sepsis vilket är en livshotande situation.		

Versionsförändringar

Version 1.2

Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.1

Filnamn tillagt.

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.