

Läkemedel

Netupitant, palonosetron Per oral kapsel

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Per oral
	Tas med eller utan mat vid
Dosering i förh. måltid:	ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Akynzeo som innehåller netupitant 300 mg och palonosetron 0,5 mg.

Kapseln tas cirka 1 timme före start av antitumoral behandling. Kapseln tas med eller utan mat.

Om dexametason ingår i behandlingen ska dexametason-dosen reduceras med cirka 50 % när det administreras tillsammans med netupitant, palonosetron.

Exponeringen för docetaxel och etoposid ökade 37 respektive 21 % när de administrerades samtidigt som netupitant, palonosetron, se FASS. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationerna dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Förpackning med 1 kapsel.

Netupitant elimineras multiexponentiellt. Skenbar halveringstid hos cancerpatienter 88 timmar. Se FASS.

Palonosetron halveringstid angiven som ungefär 40 timmar (FASS). Viss ackumulering sker vid upprepning av dos inom 3 dygn.

Små studier har visat möjlighet till upprepade doser varannan dag av kombination Palonosetron och Netupitant utan högre incidens av biverkningar, se referens.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan		
Förstoppning förekommer.		
Övrigt		
Huvudvärk och trötthet förekommer. Sömnstörning har rapporterats.		
Interaktionsbenägen substans		
Netupitant är måttlig CYP3A4-hämmare. Dexametason, Docetaxel och Etoposid berörs, se ovan alternativt FASS. Samtidig administrering med starka CYP3A4-hämmare ska ske med försiktighet (exempel ketokonazol) och samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare ska undvikas (exempel rifampicin). Samtidig användning av andra serotonerga läkemedel ökar risk för serotonergt syndrom, se FASS.		