

## Antitumoralt läkemedel

## Ofatumumab Intravenös infusion

ATC-kod: L01FA02

## BASFakta

## Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravenös

## Spädningsinformation

Spädningsvätska 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Koncentrationsintervall:	0,3-2 mg/ml
--	--------------------------	-------------

## Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan och blandas väl genom försiktig vändning av påsen.

Enligt FASS ska motsvarande volym infusionsvätska dras ut från Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml som den som motsvarar ordinerad dos Ofatumumab. Detta görs beroende på dos och lokala rutiner.

Hållbarhet efter spädning 48 timmar	Förvaring Rumstemperatur
--	-----------------------------

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b> Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
<b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b> Infusionsreaktioner vanliga, allvarliga förekommer. Premedicinering med paracetamol, antihistamin och kortikosteroid.	Monitorering	Akutberedskap
<b>Tumörlyssyndrom</b> Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.		
<b>Infektionsrisk</b> Generellt ökad infektionsrisk. Hepatit B-virus infektion och reaktivering har rapporterats vid behandling med anti-CD-20 antikroppar inklusive Ofatumumab.		
<b>Hjärttoxicitet</b> Ökad QT/QTc har setts varför elektrolytkontroll bör övervägas.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Illamående vanligt, diarré förekommer. Tarmobstruktion ovanligt, men bör övervägas vid buksmärta.		
<b>CNS påverkan</b> Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har rapporterats hos KLL-patienter med cytotoxisk farmakoterapi inklusive Ofatumumab.		
<b>Övrigt</b> Ryggsmärta förekommer.		
<b>Extravasering</b> <b>Grön</b> Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		

## Versionsförändringar

**Version 1.0**

extravaseringskod grön trots arkiverad (arkiverad)

**Version 1.0**

Produkten är avregistrerad. Förfylld spruta finns.

Substansen ingår inte i något vårdprogram vid sökning. (arkiverad)