

# Antitumoralt läkemedel

## Olaparib Per oral kapsel

## Basfakta

### Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Standarddos
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg
<b>Administreringsväg:</b>	Per oral
<b>Dosering i förh. måltid:</b>	Tas tidigast en timme efter måltid

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Olaparib tas tidigast 1 timme efter måltid och patienten uppmanas att inte äta något på 2 timmar efter intaget.

Grapefruktjuice och Johannesört ska undvikas.

Glömd dos - nästa dos tas vid vanlig tidpunkt.

Lynparza (Olaparib) kapslar (50 mg) bör INTE bytas ut mot Lynparza tabletter (100 och 150 mg) pga skillnader i dosering och biotillgänglighet för respektive formulering.

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Graviditetsvarning</b>		
Fertila kvinnor: effektivt preventivmedel under behandling och 1 månad efter sista dos. Beakta interaktionsrisk som medför dålig effekt av hormonella preventivmedel.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Illamående, kräkning, diarré, nedsatt aptit och buksmärta mycket vanligt. Dyspepsi vanligt till mycket vanligt. Stomatit vanligt. Förstoppning anges som vanligt i annan databas än FASS, tas ej upp i FASS.		
<b>Hematologisk toxicitet</b>	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.		
<b>Andningsvägar</b>		
Övre luftvägsinfektion, hosta, andfåddhet vanligt. Enstaka fall med pneumonit, utred vid misstanke.		
<b>CNS påverkan</b>		
Trötthet. Yrsel. Huvudvärk.		

Fortsättning på nästa sida

---

<b>Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
--------------------	-----------------	-----------------------------

---

**Interaktionsbenägen substans**

Olaparibs nedbrytning sker via CYP3A4/5.

Samtidig administrering av starka inducerare av CYP3A4/5 rekommenderas ej, då Olaparibs effekt kan minska betydligt. (Exempel: fenytoin, rifampicin, rifapentin, karbamazepin, nevirapin, fenobarbital och johannesört.)

Samtidig administrering av måttliga inducerare av CYP3A4/5 rekommenderas ej, då Olaparibs effekt kan minska, men kunskap saknas om hur mycket. (Exempel: efavirenz, rifabutin)

Samtidig administrering av starka eller måttliga hämmare av CYP3A rekommenderas ej, då effekten av Olaparib kan öka betydligt. (Exempel starka hämmare: itrakonazol, telitromycin, klaritromycin, proteashämmare förstärkta med ritonavir eller kobicistat, boceprevir, telaprevir och exempel på måttliga hämmare: erytromycin, diltiazem, flukonazol, verapamil). Om samtidig administrering nödvändig ska dosen av Olaparib minskas, se FASS.

Grapefruktjuice konsumtion bör också undvikas samtidigt med behandling med Olaparib.

Olaparib anses vara en mild hämmare av CYP3A varför försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering med för CYP3A känsliga substanser eller substanser med smalt terapeutisk index (t.ex. simvastatin, cisaprid, ciklosporin, ergotalkaloider, fentanyl, pimozid, sirolimus, takrolimus och quetiapin)

Samtidig administrering av statiner skall ske med försiktighet då även andra nebrytningsvägar kan påverkas.

Ytterligare möjliga interaktioner finns, se FASS.

---

**Njurtoxicitet**

Förhöjt kreatinin vanligt, oftast lätt till måttligt förhöjt, kan bli uttalat.

---