

Antitumoralt läkemedel

Olaparib Peroral kapsel

ATC-kod: L01XX46

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral
Dosering i förh. måltid:	Tas tidigast en timme efter måltid

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Olaparib tas tidigast 1 timme efter måltid och patienten uppmanas att inte äta något på 2 timmar efter intaget.

Grapefruktjuice och Johannesört ska undvikas.

Glömd dos - nästa dos tas vid vanlig tidpunkt.

Lynparza (Olaparib) kapslar (50 mg) bör INTE bytas ut mot Lynparza tableter (100 och 150 mg) pga skillnader i dosering och biotillgänglighet för respektive formulering.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Graviditetsvarning		
Fertila kvinnor: effektivt preventivmedel under behandling och 1 månad efter sista dos. Beakta interaktionsrisk som medför dålig effekt av hormonella preventivmedel.		
Gastrointestinal påverkan		
Illamående, kräkning, diarré, nedsatt aptit och buksmärta mycket vanligt. Dyspepsi vanligt till mycket vanligt. Stomatit vanligt. Förstoppning anges som vanligt i annan databas än FASS, tas ej upp i FASS.		
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.		
Andningsvägar		
Övre luftvägsinfektion, hosta, andfåddhet vanligt. Enstaka fall med pneumonit, utred vid misstanke.		
CNS påverkan		
Trötthet. Yrsel. Huvudvärk.		
Interaktionsbenägen substans		
Olaparibs nedbrytning sker via CYP3A4/5.		
Samtidig administrering av starka inducerare av CYP3A4/5 rekommenderas ej, då Olaparibs effekt kan minska betydligt. (Exempel: fenytoin, rifampicin, rifapentin, karbamazepin, nevirapin, fenobarbital och johannesört.)		
Samtidig administrering av måttliga inducerare av CYP3A4/5 rekommenderas ej, då Olaparibs effekt kan minska, men kunskap saknas om hur mycket. (Exempel: efavirenz, rifabutin)		
Samtidig administrering av starka eller måttliga hämmare av CYP3A rekommenderas ej, då effekten av Olaparib kan öka betydligt. (Exempel starka hämmare: itraconazol, telitromycin, klaritromycin, proteashämmare förstärkta med ritonavir eller kobicistat, boceprevir, telaprevir och exempel på måttliga hämmare: erytromycin, diltiazem, flukonazol, verapamil). Om samtidig administrering nödvändig ska dosen av Olaparib minskas, se FASS.		
Grapefruktjuice konsumtion bör också undvikas samtidigt med behandling med Olaparib.		
Olaparib anses vara en mild hämmare av CYP3A varför försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering med för CYP3A känsliga substanser eller substanser med smalt terapeutisk index (t.ex. simvastatin, cisaprid, ciklosporin, ergotalkaloider, fentanyl, pimozid, sirolimus, takrolimus och quetiapin)		
Samtidig administrering av statiner skall ske med försiktighet då även andra nebrytningsvägar kan påverkas.		
Ytterligare möjliga interaktioner finns, se FASS.		
Njurtoxicitet		
Förhöjt kreatinin vanligt, oftast lätt till måttligt förhöjt, kan bli uttalat.		

Versionsförändringar

Version 1.3

Avregistrerad. Olaparib tablett finns. (arkiverad)

Version 1.3

Gastrointestinal påverkan - uppdaterad.

Version 1.2

Lagt till info om att inte byta Lynparza kapsel mot tabletter.

Version 1.1

Lagt till info om grapefruktjuice och johannesört. Flyttat texten till Anvisningar för läkemedelsadministration.

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.