

Läkemedel

Ondansetron Per oral tablett

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos	Maxdos per administrationstillfälle:	32 mg
Enhet för grunddos:	mg		
Administreringsväg:	Per oral		

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges 1-2 timmar före behandling.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid 3,3-5,4 timmar, ökar med ålder.

Enligt FASS: Rekommenderad dos 8 mg före kemoterapi eller strålning, följt av 8 mg x 2 i upp till 5 dagar, uppföljning för att förebygga fördröjd och långvarig emes.

Om högemetogen behandling kan engångsdos 24 mg ges före behandling och efter 24 timmar följas av 8 mg x 2 i upp till fem dagar.

Toxicitet enl FASS: 48 mg gav lindrig intox, i ö se FASS.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan Förstoppning.		
Huvudvärk Huvudvärk vanligt.		Paracetamol
Hjärttoxicitet EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.		