

Antitumoralt läkemedel

Oxaliplatin Intraperitoneal instillation

ATC-kod: L01XA03

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intraperitoneal

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Oxaliplatin dras upp i sprutor utspädd till intraperitoneal infusion.

Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet enl. Stabilis.

Koncentrationsintervall:	5 mg/ml
Hållbarhet efter spädning	Förvaring
28 dygn	Kallt
28 dygn	Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet		
Noterad vid kombination med Irinotekan vid intraperitoneal instillation, dock vid monoterapi intraperitonealt ej rapporterad svår hematologisk toxicitet.		
Gastrointestinal påverkan		
Fistelbildning.		
Infektionsrisk		
Rapporter om djupa abscesser.		

Versionsförändringar

Version 1.3

Lagt till stabilitetsdata för sprutor till intraperitoneal infusion.

Version 1.2

Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.1

Lagt till referens

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.