

## Läkemedel

# Pegfilgrastim Subkutan injektion

ATC-kod: L03AA13

## Basfakta

### Doseringsspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Subkutan

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Administreras som en subkutan injektion cirka 24 timmar efter avslutad cytostatikabehandlingen.

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Låt den förfyllda sprutan ligga tills den uppnår rumstemperatur innan injicering.

#### Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Andningsvägar</b> Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter administrering av G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större. Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i förening med radiologiska fynd såsom lunginfiltrat eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andnödssyndrom (ARDS).		
<b>Smärta</b> Muskuloskeletal smärta inklusive ryggsmärta vanlig		Paracetamol
<b>Övrigt</b> Aortit, rapporter om sällsynta fall. Symtom som feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och förhöjda inflammationsmarkörer. Kapillärläckagesyndrom har rapporterats, utmärks av hypotoni, hypoalbuminemi, ödem och hemokoncentration. Mjältruptur har rapporterats sällsynt. Överväg diagnos om smärta vänster övre kvadrant buk Glomerulonefrit har rapporterats, reversibel vid dossänkning eller utsättning.		