Läkemedel

# Prednisolonnatriumsuccinat Intratekal injektion

Basfakta

## Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Standarddos
**Enhet för grunddos:** mg
**Administreringsväg:** Intratekal

## Anvisningar

**Anvisningar för läkemedelsadministration**
Ges tillsammans med Cytarabin och Metotrexat som IT-trippel. Vanlig komposition är Cytarabin xx mg, Metotrexat cc mg och Prednisolon-natriumsuccinat vv mg.

**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**
**Handhavande**:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

**Barnspecifik kommentar**
För barn kan dosering enligt ålder vara aktuell.

Konsultera alltid respektive protokoll.

## Spädningsinformation

**Spädningsanvisningar**
Prednisolon.natriumsuccinat (Precortalon aquosum) 25 mg löses med 1 ml Sterilt vatten. Snurra försiktigt tills lösningen är klar. Stamlösningen är 25 mg/ml.

**Hållbarhet efter spädning**
12 timmar

**Förvaring**
Kallt

## Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---|---|
| **Övrigt** | | |
| Biverkningsprofil för denna substans intratekalt är mycket oklar, men givet intratekalt ihop med andra substanser finns det beskrivet smärta vid instickstället och huvudvärk. I kombination med Metotrexat och Cytarabin finns för de substanserna arachnoidit rapporterat. | | |

## Versionsförändringar

**Version 1.4**
Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.3**
granskad för barn, barnspec kommentar

**Version 1.2**
används för barn kryssad

**Version 1.1**
uppdatering inför barnkryss

**Version 1.0**
Basfaktan fastställdes.