

## Läkemedel

# Prednisolonnatriumsuccinat Intratekal injektion

Basfakta

## Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intratekal

## Anvisningar

### Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges tillsammans med Cytarabin och Metotrexat som IT-trippel. Vanlig komposition är Cytarabin xx mg, Metotrexat cc mg och Prednisolon-natriumsuccinat vv mg.

### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

#### Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

### Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering enligt ålder vara aktuell.

Konsultera alltid respektive protokoll.

## Spädningsinformation

### Spädningsanvisningar

Prednisolon.natriumsuccinat (Precortalon aquosum) 25 mg löses med 1 ml Sterilt vatten. Snurra försiktigt tills lösningen är klar. Stamlösningen är 25 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning  
12 timmar

Förvaring  
Kallt

## Biverkningar

### Observandum

### Kontroll

### Stödjande behandling

#### Övrigt

Biverkningsprofil för denna substans intratekalt är mycket oklar, men givet intratekalt ihop med andra substanser finns det beskrivet smärta vid instickstället och huvudvärk. I kombination med Metotrexat och Cytarabin finns för de substanserna arachnoidit rapporterat.

## Versionsförändringar

### Version 1.4

Lagt till handhavandeinfo.

### Version 1.3

granskad för barn, barnspec kommentar

### Version 1.2

används för barn kryssad

### Version 1.1

uppdatering inför barnkryss

**Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.