

Antitumoralt läkemedel

Prokarbazin Per oral kapsel

Licenspreparat

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Per oral

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Patienten bör varnas för samtidigt alkoholintag, prokarbazin har antabus-effekt. De bör också undvika mat med högt innehåll av tyramin, t.ex. vin, yoghurt och bananer.

Intag på kvällen kan minska illamåendet.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat Natulan kapsel 50 mg från Sigma-Tau finns.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan		
Illamående. Antabus liknande effekter finns – varför alkoholintag skall undvikas.		
Interaktionsbenägen substans		
Anses vara en svag MAO-hämmare. Försiktighet med antidepressiva (särskilt tricykliska ämnen) pga risk för serotonergt syndrom, centralstimulantia (metylfenidat och selegilin - serotonergt syndrom) samt antipsykotika (fentiazin, thiopental) och antihistaminer för systemiskt bruk pga risk för CNS-depression (mekanism okänd).		
Hypertoni		
Tyraminrik mat som mögelost, banan, yoghurt och vin bör undvikas för att minska risk för hypertoni, då prokarbazin fungerar som svag MAO-hämmare.		