

Läkemedel

Propranolol Peroral tablett

ATC-kod: C07AA05

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral
Dosering i förh. måltid:	Tas en halv timme före måltid

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Alkohol kan påverka effekten av detta läkemedel.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hjärttoxicitet		
Bradykardi vanligt, AV-block har rapporterats. Försämring av hjärtsvikt har rapporterats.		
Övrigt		
Perifer kyla extremiteter vanligt. Raynauds fenomen förekommer. Trötthet, muskelsvaghet och hypotension har rapporterats.		
CNS påverkan		
Yrsel förekommer. Sömnstörningar och hallucinationer har rapporterats. Försämring i Myastenia Gravis har rapporterats.		
Andningsvägar		
Andfåddhet förekommer. Bronkospasm hos patienter med astma har rapporterats.		
Endokrinologi		
Betablockare kan maskera tecken på hypertyreos eller hypoglykemi (främst genom att minska takykarditendens). Risk för upphov till eller förlängd hypoglykemi hos diabetiker. Enstaka fall av hypoglykemi även hos icke-diabetiker har rapporterats.		
Immunologisk reaktion		
Propranolol kan förstärka en anafylaktisk reaktion och behandling med adrenalin i normal dos ger inte alltid förväntad effekt.		
Interaktionsbenägen substans		
Samtidig administrering av barbitursyraderivat och propranolol bör undvikas, då metaboliseringen av betablockare induceras.		
Samtidig administrering av propafenon och propranolol bör undvikas, då plasmakoncentrationen av propranolol kan stiga.		
Samtidig administrering av verapamil och propranolol bör undvikas, då risken för bradykardi och blodtrycksfall ökar.		
Ett stort antal substanser kan kräva dosanpassning vid samtidig administrering med propranolol, se FASS för information (amiodaron, klass-I-antiarytmika, NSAID, cimetidin, diltiazem, epinefrin, fenylpropanolamin, fluvoxamin, kinidin, klonidin, klorpromazin, lidokain, rifampicin, rizatriptan, teofyllin).		

Versionsförändringar

Version 1.2

Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.1

justerad observandum profil

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.