

Läkemedel

Rasburikas Intravenös infusion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsvikt
Enhet för grunddos:	mg/kg
Administreringsväg:	Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska
till 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar
Rasburikas späds med hela volymen av den bifogade ampullen med spädningsvätska (1,5 mg späds med 1 ml; 7,5 mg med 5 ml). Sväng runt lösningen, skaka inte! Stamlösningen har koncentrationen 1,5 mg/ml.

Volym att dra upp beror på patientens kroppsvikt. Denna späds med Natriumklorid 9 mg/ml till en sammanlagd volym på 50 ml.

Hållbarhet efter spädning	Förvaring
24 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)	Kallt

Biverkningar

<u>Observandum</u>	<u>Kontroll</u>	<u>Stödjande behandling</u>
Akut infusionsreaktion/anafylaxi Vanligast med mindre allvarliga allergiska reaktioner så som hudutslag och urtikaria. Enstaka händelser med hypotension, bronkospasm, rinit och allvarlig anafylaxi har inträffat.		Akutberedskap
Hematologisk toxicitet Fallrapporter med methemoglobinemi och hemolys, se FASS.		
Infektionsrisk Feber är vanligt.		