

Antitumoralt läkemedel

Streptozocin Intravenös infusion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Hållbarhet efter spädning	Förvaring
12 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)	Kallt

Spädningsanvisningar

Streptozocin 1 g (1000 mg) löses med 9,5 ml Natriumklorid 9 mg/ml, vilket ger en stamlösning med koncentrationen 100 mg/ml. Denna späds därefter vidare.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hög emetogenicitet Antiemetika enligt lokala protokoll.		Antiemetika
Njurtoxicitet Toxicitet dosrelaterad och kumulativ, risk ökar om tidigare njursjukdom eller kombination med andra nefrotoxiska läkemedel. Mild proteinuri är ett tidigt tecken på njurtoxicitet.		
Gastrointestinal påverkan Diarre vanligt.		
Endokrinologi Hyper/hypoglykemi förekommer.		