

# Läkemedel

## Tamoxifen Per oral tablett

Basfakta

### Doseringsaspekter

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Beräkningssätt:</b>          | Standarddos   |
| <b>Enhet för grunddos:</b>      | mg  |
| <b>Administreringsväg:</b>      | Per oral  |
| <b>Dosering i förh. måltid:</b> | Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag |

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Dosen tas 1 gång per dag, kan också delas på 2 doseringstillfällen.

Missad dos tas så snart patienten kommer ihåg den. Ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt.

### Biverkningar

| Observandum  | Kontroll | Stödjande behandling |
|--|----------|----------------------|
| <b>Hematologisk toxicitet</b><br>Anemi, trombocytopeni och leukopeni har rapporterats.   |          |                      |
| <b>Övrigt</b><br>Värmevallningar vanliga.  |          |                      |
| <b>Övrigt</b><br>Vaginal blödning och vaginala flytningar vanligt. Endometrieförändringar (inklusive hyperplasi och polyper) förekommer. Klåda vulva.<br>Ökad incidens av endometrie-cancer och uterus sarkom har rapporterats hos postmenopausala patienter, se FASS. |          |                      |
| <b>Gastrointestinal påverkan</b><br>Illamående vanligt, oftast övergående. Kräkningar, diarré och förstoppning förekommer.   |          |                      |
| <b>Levertoxicitet</b><br>Förhöjda leverprover förekommer. Levercirros och leversvikt har rapporterats.   |          |                      |
| <b>Övrigt</b><br>Vätskeretention vanligt (perifera ödem och ödem omnämns).   |          |                      |
| <b>Hudtoxicitet</b><br>Hudutslag vanligt. Alopeci/hårfall förekommer. Ovanligare svåra hudproblem har sällsynt rapporterats (erytema multiforme, pemfigusliknande blåsor, Stevens-Johnsons syndrom).   |          |                      |
| <b>Tromboembolism</b><br>Tromboemboliska händelser förekommer (inklusive djup ven trombos, mikrovaskulär trombos och pulmonell emboli).  |          |                      |
| <b>CNS påverkan</b><br>Sensoriska störningar förekommer (inklusive parestesi (känselförändring) och dysgeusi (smakförändring)). Yrsel och huvudvärk förekommer. Opticusneurit sällsynt.  |          |                      |

Fortsättning på nästa sida

**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling**

---

**Interaktionsbenägen substans**

Samtidig administration av Tamoxifen och warfarin kan kräva dosanpassning.

Samtidig administration av Tamoxifen med cytostatika ger ökad risk för tromboemboliska händelser.

Samtidig administrering av Tamoxifen och fenytoin kan hämma metabolism av fenytoin enligt en fallrapport, varför rekommendation om att kontrollera plasmakoncentration av fenytoin.

Samtidig administrering av Tamoxifen och CYP3A4-inducerare förväntas minska plasmakoncentration av Tamoxifen.

Samtidig administrering av Tamoxifen och CYP3A4-hämmare förväntas öka plasmakoncentration av Tamoxifen.

Samtidig administrering av Tamoxifen och potenta CYP2D6-hämmare bör undvikas då en möjlig minskad effekt av Tamoxifen ej kan uteslutas. (Exempel på potenta CYP2D6-hämmare är: paroxetin, fluoxetin, kinidin, cinacalcet eller bupropion.)

---