

Antitumoralt läkemedel

Tegafur, gimeracil, oteracil Per oral kapsel

Basfakta

Doseringsaspekter

| | |
|---------------------------------|---|
| Beräkningssätt: | Kroppsyta |
| Enhet för grunddos: | mg/m ² |
| Administreringsväg: | Per oral |
| Dosering i förh. måltid: | Tas minst en timme före eller en timme efter måltid |

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Teysuno, också benämnd S-1. Kapslarna finns i styrkorna 15 mg tegafur, 4,35 mg gimeracil, 11,8 mg oteracil respektive 20 mg/5,8 mg/15,8 mg.

Doseras 2 gånger dagligen, morgon och kväll.

Om doser glöms bort ska patienten inte kompensera för uteblivna doser.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tre aktiva substanser ingår. Tegafur omvandlas efter absorption till fluorouracil, gimeracil hämmar nedbrytning av fluorouracil och oteracil minskar aktiviteten hos fluorouracil i normal gastrointestinal mukosa.

Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. | Blodvärden | Enligt lokala riktlinjer |
| Gastrointestinal påverkan Diarré vanligt. Profylax kan behövas. I övrigt förekommer även kräkningar, illamående och förstoppning. | Biverkningskontroll Elektrolyter | Loperamid Hydrering |
| Njurtoxicitet Dehydrering och diarré kan öka risken för njurtoxicitet, vilket bör beaktas vid kombination med njurtoxiska preparat. | Njurfunktion | Hydrering |
| Ögonpåverkan Ökat tårflöde, torra ögon. Symtomlindrande behandling kan behövas. | Biverkningskontroll | |

Övrigt

DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart.

Om testning ej sker ska DPD brist misstänkas vid allvarlig slemhinnetoxicitet och/eller hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling alternativt fortsatt behandling med kraftigt reducerade doser