

Antitumoralt läkemedel

Toremifen Peroral tablett

ATC-kod: L02BA02

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral
Dosering i förh. måltid:	Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om du glömt att ta en dos, ta nästa tablett som vanligt och fortsätt behandlingen enligt anvisningen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk,
<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	
Leukopeni och trombocytopeni har rapporterats. Kontroll av blodstatus under behandlingen.		
Hudtoxicitet		
Värmevallningar och svettning vanligt. Utslag och klåda har rapporterats.		
Övrigt	Biverkningskontroll	
Uterin blödning och vita flytningar förekommer. Endometriehypertrofi finns rapporterat, endometriepolyp ovanligt. Fallrapport om endometriecancer. Gynekologisk undersökning bör göras före behandlingsstart och därefter minst en gång per år under behandlingen.		
Tromboembolism		
Tromboemboliska händelser har rapporterats. Patienter med tidigare svår tromboembolisk sjukdom bör normalt inte behandlas med toremifen.		
Hjärttoxicitet	Hjärtfunktion	
Toremifen ger dosberoende förlängning av QT-intervallet, varför försiktighet vid proarytmiska tillstånd (som akut myokardischemi eller känd QT-förlängning). EKG ska tas före start och om QT-intervall >500 ms skall toremifen ej användas.		
Gastrointestinal påverkan		
Illamående och kräkning förekommer. Förstoppning finns rapporterat.		
Levertoxicitet	Leverfunktion	
Förhöjda levervärden förekommer, endast fallrapporter med grad 3 - 4. Inträffar oftast under de första behandlingsmånaderna.		
Övrigt		
Yrsel förekommer. Trötthet, huvudvärk och depression finns rapporterat.		
Övrigt	Elektrolyter	
Hyperkalcemi har rapporterats i fåtal fall hos patienter med skelettmetastaser. Inträffar i början av behandlingen. Tumor flare omnämns, övergående diffusa smärtor muskuloskeletalt hos patienter med skelettmetastaser, associerat med hyperkalcemi.		

Versionsförändringar

Version 1.1
Stavfel.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.