

# Antitumoralt läkemedel

## Trastuzumab Subkutan injektion

BASFakta

### Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Subkutan

### Anvisningar

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras subkutant under 2-5 minuter i låret, alternera mellan vänster och höger lår.

### Spädningsinformation

#### Spädningsanvisningar

Hela dosen dras upp i en 5 ml spruta som försluts och märks.

Hållbar 48 timmar kallt PLUS 6 timmar i rumstemperatur.

Hållbarhet efter spädning  
54 timmar

Förvaring  
Kallt

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi	Blodtryck  Puls	Akutberedskap Paracetamol Antihistamin
<b>Hematologisk toxicitet</b> Anemi och neutropeni förekommer. Febril neutropeni anges i FASS som vanlig.		
<b>Hjärttoxicitet</b> Hjärtsvikt förekommer, kan bli uttalad, kan uppstå relativt lång tid efter behandlingen avslutad. LVEF (vänsterkammarfunktion) bör monitoreras regelbundet. Vid försämring av LVEF finns åtgärdsriktlinjer, se FASS. Notera risk interaktion antracykliner (kardiotoxiskt, även kumulativt). I övrigt omnämns hjärklappning och oregelbunden hjärtrytm.		
<b>Andningsvägar</b> Hosta och dyspné (andfäddhet) vanligt. Rinnsnuva och näsblod vanligt. Interstitiell pneumonit, ARDS (akut andningsinsufficiens) och akut lungödem finns rapporterat. Nyttillkomna eller akut förändrade andningssymtom ska utredas.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Illamående, kräkningar och buksmärta vanligt. Diarré och förstoppning vanligt. Stomatit. Aptitnedgång och viktminskning vanligt.		
<b>CNS påverkan</b> Huvudvärk vanligt. Yrsel förekommer. Parestesi förekommer. Perifer neuropati finns rapporterat. Sömnbesvär.		
<b>Övrigt</b> Trötthet vanligt. Artralgi och myalgi förekommer.		