

Antitumoralt läkemedel

Trifluridin, tipiracilhydroklorid Per oral tablett

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta	Maxdos per administrationstillfälle:	80 mg
Enhet för grunddos:	mg/m ²		
Administreringsväg:	Per oral		
Dosering i förh. måltid:	Tas i samband med måltid		

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Lonsurf som finns i styrkor 15 mg (trifluridin)/6,14 mg (tipiracilhydroklorid) och 20 mg/8,19 mg.

Doseras 2 gånger dagligen, morgon och kväll.

Tabletterna tas inom 1 timme efter frukost och kvällsmat.

Om doser glöms bort ska patienten inte kompensera för uteblivna doser.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Två olika aktiva substanser ingår - trifluridin och tipiracil.

Trifluridin stoppar cancercellernas tillväxt men metaboliseras lätt vid first-pass-effekt efter oral administrering. Tipiracil förhindrar nedbrytningen av trifluridin och bidrar till att trifluridin verkar under en längre tid.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
Gastrointestinal påverkan		
Illamående, aptitnedgång, diarré, kräkning och buksmärtor är mycket vanliga till vanliga. Symptomatisk behandling vid behov. Eventuellt dosreduktionsbehov, se FASS.		
Slemhinnetoxicitet		
Stomatit.		
Njurtoxicitet		
Proteinuri förekommer. Icke-infektiös cystit och njursvikt ovanligt. Däremot är en sedan tidigare måttligt sänkt njurfunktion associerad med högre grad av biverkningar och dessa patienter bör bevakas noggrant vad det gäller hematologisk toxicitet.		
Övrigt		
Trötthet vanligt. Feber, sjukdomskänsla, sömnlöshet och ödem relativt vanligt. Känsla av förändrad kroppstemperatur förekommer, liksom allmän försämring och smärta.		
Hudtoxicitet		
Utslag, hårfall, klåda, torr hud och hand-fot syndrom (PPE) förekommer.		
Övrigt		
Vid tidigare strålbehandling kan en högre incidens av biverkningar ses.		
Andningsvägar		
Dyspné och hosta förekommer. Nasofaryngit och rinnsnuva ovanligt. Lungemboli ovanligt.		
CNS påverkan		
Huvudvärk, svindel och perifer neuropati förekommer.		