

## Antitumoralt läkemedel

## Trifluridin, tipiracil (TAS-102) Peroral tablett

ATC-kod: L01BC59

Basfakta

## Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta	Maxdos per administrationstillfälle:	80 mg
Enhet för grunddos:	mg/m <sup>2</sup>		
Administreringsväg:	Peroral		
Dosering i förh. måltid:	Tas i samband med måltid		

## Anvisningar

## Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Lonsurf som finns i styrkor 15 mg (trifluridin)/6,14 mg (tipiracilhydroklorid) och 20 mg/8,19 mg.

Doseras 2 gånger dagligen, morgon och kväll.

Tabletterna tas inom 1 timme efter frukost och kvällsmat.

Om doser glöms bort ska patienten inte kompensera för uteblivna doser.

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Två olika aktiva substanser ingår - trifluridin och tipiracil.

Trifluridin stoppar cancercellernas tillväxt men metaboliseras lätt vid first-pass-effekt efter oral administrering. Tipiracil förhindrar nedbrytningen av trifluridin och bidrar till att trifluridin verkar under en längre tid.

## Handhavande

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b> Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Illamående, aptitnedgång, diarré, kräkning och buksmärter är mycket vanliga till vanliga. Symptomatisk behandling vid behov. Eventuellt dosreduktionsbehov, se FASS.		
<b>Slemhinnetoxicitet</b> Stomatit.		
<b>Njurtoxicitet</b> Proteinuri förekommer. Icke-infektiös cystit och njursvikt ovanligt. Däremot är en sedan tidigare måttligt sänkt njurfunktion associerad med högre grad av biverkningar och dessa patienter bör bevakas noggrant vad det gäller hematologisk toxicitet.		
<b>Övrigt</b> Trötthet vanligt. Feber, sjukdomskänsla, sömnlöshet och ödem relativt vanligt. Känsla av förändrad kroppstemperatur förekommer, liksom allmän försämring och smärta.		
<b>Hudtoxicitet</b> Utslag, hårfall, klåda, torr hud och hand-fot syndrom (PPE) förekommer.		
<b>Övrigt</b> Vid tidigare strålbehandling kan en högre incidens av biverkningar ses.		
<b>Andningsvägar</b> Dyspné och hosta förekommer. Nasofaryngit och rinnsnuva ovanligt. Lungemboli ovanligt.		
<b>CNS påverkan</b> Huvudvärk, svindel och perifer neuropati förekommer.		

## Versionsförändringar

### **Version 1.2**

Förtydligat namn i enlighet med vad man skriver i vårdprogram.

### **Version 1.1**

Lagt till handhavandeinfo.

### **Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.