

# Antitumoralt läkemedel

## Triptorelin Intramuskulär injektion

## Basfakta

### Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Standarddos
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg
<b>Administreringsväg:</b>	Intramuskulär

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Triptorelin används vid flera olika indikationer. Kontrollera att det är preparatet som används för den aktuella indikationen du använder.

Injektionsstället bör varieras. Se hanterings- och beredningsinstruktioner i FASS för respektive förpackning eller film via <https://www.medicininstruktioner.se/hcp/ipsen/pamorelin/>

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Övrigt</b>		
Både män och kvinnor: Värmevallningar mycket vanliga. Minskad libido (sexuell lust) vanligt.		
Män: Erekttil dysfunktion vanligt, gynekomasti och smärta bröst finns rapporterat. Testikelatrofi finns rapporterat.		
Kvinnor: Vaginal torrhet, bäckensmärta, förändringar och smärta i bröst vanligt. Menstruationsrubbingar förekommer.		
<b>Övrigt</b>		
Humörförändringar och depression förekommer. Sömnbesvär finns rapporterat.		
<b>Hudtoxicitet</b>		
Hyperhidros (ökad svettning) vanligt. Akne förekommer och alopeci (hårfall) finns rapporterat.		
Reaktioner vid injektionsställe som rodnad, smärta och svullnad förekommer.		
<b>CNS påverkan</b>		
Parestesi förekommer. Yrsel och huvudvärk förekommer.		
<b>Endokrinologi</b>		
Hyperglykemi eller nedsatt glukostolerans finns rapporterat.		
Män: I början av triptorelinbehandling kan man se testosteronförhöjning, vilket bland annat kan leda till skelettsmärta vid skelettmetastaser, risk för trombos, försämrat urinflöde. För att minska dessa effekter rekommenderas antiandrogen behandling inför och under den första tiden med triptorelinbehandling, se FASS.		
<b>Övrigt</b>		
Muskelsmärta, ryggsmärta förekommer. Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos.		
<b>Hjärttoxicitet</b>		
Förlängd QT-tid finns beskrivet för androgen deprivationsterapi. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.		
Hypertoni finns rapporterat.		