

# Antitumoralt läkemedel

## Trofosamid Peroral tablett

Licenspreparat

ATC-kod: L01AA07

BASFakta

### Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Standarddos  
**Enhet för grunddos:** mg  
**Administreringsväg:** Peroral

### Anvisningar

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat Ixoten Baxter 50 mg finns.

#### Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)<https://cancercentrum.se/contentassets/59704405fb4645a7918481e5c9976e7c/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b>		
Leukopeni förekommer. Anemi och trombocytopeni har rapporterats.		
Dosjustering eller kortvarigt uppehåll av behandlingen vid uttalad leukopeni eller trombocytopeni.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Illamående och kräkning förekommer.		
Eventuellt dosjusteringsbehov, kortvarigt uppehåll i behandlingen alternativt antiemetikabehandling.		
<b>Hudtoxicitet</b>		
Håravfall förekommer.		
<b>Immunologisk reaktion</b>		
Överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Hudreaktioner.		
<b>Övrigt</b>		
Cystit/urinblåsirritation inkluderande blod i urin har rapporterats. Framför allt vid höga doser och högrisk patienter så som tidigare strålbehandling mot bäcken, tidigare cystiter av cyklofosamid, ifosamid eller trofosamidbehandling eller njurvägsbekymmer i anamnesen.		
<b>CNS påverkan</b>		
Yrsel, trötthet/utmattning finns omnämnt. Neuropati mycket ovanligt.		
<b>Övrigt</b>		
Fallrapporter om sekundära maligniteter och förstadier till maligniteter. Dock ej helt säkerställt orsakssamband.		